

ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS : RECOMMANDATIONS D'UTILISATION SELON LA FONCTION RENALE

		Apixaban (ELIQUIS®)			Dabigatran (PRADAXA®)			Rivaroxaban (XARELTO®)		
Indications		FANV	TVP/EP	ETE V	FANV	TVP/EP	ETE V	FANV	TVP/EP	ETE V
Clairance de la Créatinine (ClCr) en mL/min	ClCr ≥ 50	Autorisé			Autorisé			Autorisé		
	30 ≤ ClCr < 50	Autorisé			Adaptation posologique à envisager 110 mg x 2 fois/jour		Adaptation posologique 150 mg x 1 fois/jour	Adaptation posologique si risque élevé de saignement A partir de J22 : 15 mg x 1 fois/jour		Autorisé
	15 ≤ ClCr < 30	Adaptation posologique 2,5 mg x 2 fois/jour	Prudence	Prudence	Contre-indiqué			Adaptation posologique 15 mg x 1 fois/jour	Prudence	
	ClCr < 15	Non recommandé			Contre-indiqué			Non recommandé		



Autorisé à posologie usuelle



Non recommandé ou déconseillé



Prudence/adaptations posologiques/surveillance



Contre-indiqué