

DCI/ Spécialités	Formes galéniques	Posologie usuelle journalière	Posologie maximale	Nb de prises par jour	Populations particulières		
<b>Amisulpride</b> (Solian®)	- Cp : 100-200-400 mg - Solution buvable : 100 mg/ml - Solution injectable : 200 mg/4ml	Episodes négatifs prédominants	50-300 mg	<b>1200 mg/j</b>	1	Insuffisants rénaux : - ClCr 30-60 ml/min : ½ dose - ClCr 10-30 ml/min : ⅓ dose - Non recommandé si ClCr < 10 ml/min	
		Episodes psychotiques aigus	400-800 mg		2		
<b>Aripiprazole</b> (Abilify®)	- Cp : 5-10-15 mg - Solution buvable : 1 mg/ml  Solution injectable : 7,5 mg/ml, 9,75 mg/flacon	Voie orale	10-15 mg	<b>30 mg/j</b>	1	- Sujets âgés : dose initiale plus faible - Administration concomitante d'inhibiteurs ou inducteurs puissants du CYP3A4 ou du CYP2D6	
		Injection intramusculaire	5,25-15 mg		1-3		
<b>Clozapine</b> (Leponex®)	Cp : 25-100 mg	Troubles psychotiques au cours de la maladie de Parkinson	25-37,5 mg	<b>100 mg/j</b>	1-2 La posologie journalière totale peut être répartie de manière inégale, la dose la plus importante devant être administrée au coucher	Sujet âgés ≥ 60 ans : instauration à une dose faible (12,5 mg le premier jour), chaque palier d'augmentation posologique étant limité à 25 mg/jour	
		Schizophrénie résistante au traitement	200-450 mg				<b>900 mg/j</b>
<b>Olanzapine</b> (Zyprexa®)	Cp : 5-7,5-10-15-20 mg  Solution injectable : 10 mg/flacon	Voie orale	5-20 mg	<b>20 mg/j</b>	1	- Sujet âgés ≥ 65 ans, insuffisants rénaux ou hépatiques : dose initiale plus faible à envisager - Administration concomitante d'inhibiteurs du CYP1A2	
		Injection intramusculaire	5-10 mg		1-3 <b>pendant 3 jours consécutifs maximum</b>		
<b>Quétiapine</b> (Xeroquel®)	Cp : 50-300-400 mg	Schizophrénie/épisodes maniaques modérés à sévères dans les troubles bipolaires	400-800 mg	<b>800 mg/j</b>	1 Très sédatif, à prendre le soir à distance des repas	Sujets âgés et insuffisants rénaux : dose initiale de 50 mg/jour et augmentation par palier de 50 mg/jour	
		Episodes dépressifs majeurs dans les troubles bipolaires	300-600 mg				<b>600 mg/j</b>
		Prévention des récurrences dans les troubles bipolaires	300-800 mg				<b>800 mg/j</b>
		En association dans le trouble dépressif majeur	150-300 mg				<b>300 mg/j</b>
<b>Risperidone</b> (Risperdal®)	- Cp : 0,5-1-2-3-4 mg - Solution buvable : 1 mg = 1 ml	Schizophrénie	4-6 mg	<b>16 mg/j</b>	1-2	- Sujets âgés : <b>maximum 1-2 mg x 2/jour</b> - Insuffisants rénaux ou hépatiques : posologies initiale et d'entretien divisées par deux, augmentation posologique des doses plus lente - Association aux inhibiteurs puissants du CYP2D6 et aux inhibiteurs/inducteurs puissants du CYP3A4 et de la P-gp	
		Episodes maniaques associés aux troubles bipolaires	1-6 mg		-		1
		Agressivité persistante chez les patients avec une démence d'Alzheimer modérée à sévère	0,5- 1 mg max 6 semaines		<b>2 mg/j</b>		2

Sources :

- Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) en vigueur en décembre 2024